

잔디밭 전용 발아전 토양처리 제초제

나가초

유제



새포아풀



바랭이

품목명 : 오리잘린 · 펜디메탈린 유제 유효성분 : Oryzalin 3% + Pendimethalin 25% 계통 : 디니트로아니린계 (H03) + 디니트로아니린계 (H03)
 독성 : 저독성, 어독성 1급 포장단위 : 100ml, 500ml

「나가초」 유제 특징

- 1 **잡초 발생 전 토양처리형 제초제**

디니트로아니린계인 오리잘린과 펜디메탈린의 혼합제로 잡초발생 전에 토양에 처리하는 제초제입니다.
- 2 **일년생 화본과 잡초 및 광엽 잡초에 우수한 방제효과**

바랭이, 새포아풀 등 일년생 화본과 잡초 및 광엽 잡초에 우수한 방제효과를 나타냅니다.
- 3 **긴 약효 지속기간**

「나가초」는 잔효성이 길어 약효가 오래 지속됩니다.

적용대상 및 사용량

| 작물명 | 적용잡초 | 사용적기 및 방법 | 물 20ℓ 당 사용약량 | 1,000㎡(10a)당 사용량 | |
|------|-------|------------|--------------|------------------|----------|
| | | | | 약량 | 살포량 |
| 한국잔디 | 일년생잡초 | 잡초발생전 토양처리 | 40~50ml | 500ml | 200~250ℓ |



- 사용 방법**
1. 잡초 발아 전 처리제이므로 잔디밭의 잡초가 발아하기 전에 토양전면에 골고루 뿌리십시오.
 ▶ 봄처리 : 3월초~4월초 사이 잡초가 발아하기 전에 소정의 약량을 균일하게 뿌리십시오.
 ▶ 가을처리 : 새포아풀 등 겨울잡초가 발생하기 직전에 소정의 약량을 균일하게 뿌리십시오.
 2. 토양이 건조할 때는 사용약량의 변동없이 살포물량을 늘려서 사용하십시오.



- 주의 사항**
1. 새로 조성된 잔디에는 약해의 우려가 있으므로 이미 조성된 잔디에만 사용하십시오.
 2. 서양잔디(벤트그라스 등)에 사용할 경우 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
 3. 비가 오기 직전 혹은 직후에는 사용하지 마십시오.
 4. 적박한 사질토, 답압이 심한 곳, 병충해 피해 및 약해를 받은 잔디와 한발, 동해, 비료부족, 솟치과다 등으로 생육이 부진하거나 뿌리의 발육이 불량한 잔디에는 생육이 억제되는 경우가 있으므로 약제살포를 피하십시오.
 5. 살포액이 한 군데로 물리지 않도록 잔디밭 전면에 균일하게 뿌리십시오.
 6. 솟치제거, 팻치커링, 에어레이션 작업 등은 적어도 약제살포 2~3주 전에 끝내십시오.